

ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_

TECNICO COMPILATORE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ 

TOTALE VITELLI PRESENTI	
-------------------------	--

CODICE ALLEVIX \_\_\_\_\_ 

N° ANIMALI PER CICLO	
----------------------	--

CODICE APA \_\_\_\_\_ 

N° ANIMALI CIRCOLANTI IN ALLEVAMENTO IN 1 ANNO	
--	--

RAZZE PRESENTI \_\_\_\_\_

<b>AREA</b>	<b>A</b>	<b>MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE</b>
-------------	----------	---

Elemento di verifica	<b>1</b>	<b>Numero di addetti che si occupano degli animali</b>
----------------------	----------	--

Un operatore per più di 800 animali presenti al momento della visita	
Un operatore per un numero di animali compreso tra 400 e 800 capi presenti al momento della visita	
Un operatore per meno di 400 animali presenti al momento della visita	

Elemento di verifica	<b>2</b>	<b>Formazione degli addetti</b>
----------------------	----------	---------------------------------

**Il corso si considera di almeno 4 ore (mezza giornata o 2 incontri serali), con rilascio di attestato di partecipazione, effettuato nei 3 anni precedenti da almeno un soggetto sia esso il titolare o il dipendente assunto**

Esperienza minore di 10 anni e nessun corso di formazione	
Esperienza di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sull'allevamento del vitello a carne bianca	
Esperienza di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente seguito negli ultimi 3 anni	

Elemento di verifica	<b>3</b>	<b>Gestione dei gruppi</b>
----------------------	----------	----------------------------

16 o più animali per gruppo e/o promiscuità di animali di taglie differenti o animali legati	
Tra 7 e 15 animali per gruppo con taglie poco difformi	
6 o meno animali per gruppo, omogenei per età, taglia e tipologia di soggetto	

Elemento di verifica	<b>4</b>	<b>Numero di ispezioni</b>
----------------------	----------	----------------------------

**Si considerano le ispezioni giornaliere in stalla aldilà di quelle eseguite per le attività di routine (es. distribuzione razione, pulizia box, ecc.). La segnalazione scritta può essere sostituita in caso di immediata separazione del soggetto/i identificato/i**

1 ispezione/giorno	
2 o più ispezioni/giorno	
Più di 2 ispezioni/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata	

Elemento di verifica	<b>5</b>	<b>Tipologia di movimentazione</b>
----------------------	----------	------------------------------------

**È rivolta prevalentemente alla movimentazione durante le operazioni di carico/scarico e per cambiare gruppo/box all'interno della stalla**

Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)	
Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)	

Elemento di verifica	<b>6</b>	<b>Gestione della razione</b>
----------------------	----------	-------------------------------

**La razione specifica deve essere scritta su carta o inserita su pesa**

Razione empirica senza calcoli relativi ai fabbisogni o presenza di indicazioni sommarie e datate e/o scorretta conservazione degli alimenti	
Razione calcolata da un alimentarista e corretta conservazione degli alimenti	

Elemento di verifica	<b>7</b>	<b>Frequenza di somministrazione del latte</b>
----------------------	----------	--

1 volta/giorno	
2-3 volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana	
4 o più volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana e/o mediante sistema automatizzato e controllato	

Elemento di verifica **8 Preparazione del latte**  
**E fondamentale che durante la preparazione e la distribuzione del latte gli addetti si attengano ad una specifica procedura che dovrebbe essere scritta su carta, esposta e visibile nel locale di preparazione del latte, o vengano impiegati sistemi computerizzati di miscelazione**

Assenza di procedura scritta	
Presenza di procedura scritta, esposta o facilmente consultabile nel locale latte	
Presenza di procedura scritta ed impiego di sistemi computerizzati di miscelazione	

Elemento di verifica **9 Somministrazione di alimento fibroso**  
**Dopo la seconda settimana d'età tutti i vitelli devono ricevere alimenti fibrosi**

Alimento fibroso assente dalla 2ª fino all'8ª settimana d'età	
Alimento fibroso in quantità adeguata dalla 2ª fino all'8ª settimana d'età	
Alimento fibroso in quantità adeguata e di lunghezza compresa tra 0,4 - 1 cm (paglia, fieno, insilato di mais, ecc.) dopo la 2ª settimana d'età	

Elemento di verifica **10 Frequenza di somministrazione dell'alimento fibroso**

1 volta/giorno	
2 volte/giorno	
Più di 2 volte/giorno o <i>ad libitum</i>	

Elemento di verifica **11 Quantità di alimento solido**

**Il quantitativo giornaliero di alimento fibroso deve essere portato da 50 a 250 grammi/giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane**

Somministrazione di alimenti fibrosi inferiore al limite di legge	
Somministrazione di alimenti fibrosi conforme o leggermente superiore (10%) al limite di legge	
Somministrazione di alimenti fibrosi superiore al limite di legge (almeno più del 10%)	

Elemento di verifica **12 Disponibilità di acqua**

**A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande**

Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i> ) per uno o più vitelli oltre le 8 settimane d'età, oppure quantità di latte somministrato tra le 2 e le 8 settimane di età non sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico dei vitelli	
Presenza di abbeveratoi funzionanti a spinta o a ciuccio oltre le 8 settimane di età ed in infermeria e soddisfacimento del fabbisogno idrico per i vitelli tra le 2 e le 8 settimane d'età attraverso la somministrazione di una adeguata quantità di latte	
Acqua <i>ad libitum</i> per tutti i vitelli	

Elemento di verifica **13 Pulizia degli abbeveratoi**

**L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcizia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio**

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi	
Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida/ciuccio	

Elemento di verifica **14 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera**

**NON considerare il tipo di materiale utilizzato per la lettiera. Valutare l'igiene, la pulizia e la gestione dello spazio adibito al decubito degli animali. La lettiera deve essere asciutta, pulita (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e correttamente gestita con rabbocco settimanale e sostituita a fine ciclo di ingrasso. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione sarà al massimo intermedia**

Ambienti sporchi e non gestiti e/o assenza di lettiera in quasi tutti i gruppi	
Ambienti discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi	
Ambienti puliti ed asciutti, lettiera con materiale idoneo e rabbocco a giorni alterni in tutti i gruppi	

Elemento di verifica **15 Pulizia delle attrezzature per l'alimentazione**

Attrezzature e mangiatoie sporche con presenza di evidenti ed abbondanti incrostazioni	
Attrezzature e mangiatoie pulite	
Attrezzature e mangiatoie pulite, senza residui o incrostazioni, lavate dopo ogni pasto o prima del successivo	

Elemento di verifica **16** **Biosicurezza**

**Questa valutazione è eseguita a posteriori dal sistema di calcolo informatico, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'Area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nella mandria**

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0° - 33° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1° - 66° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1° - 100° percentile)	

<b>AREA</b>	<b>B</b>	<b>STRUTTURE ED ATTREZZATURE</b>
-------------	----------	----------------------------------

Elemento di verifica **17** **Tipologia di stabulazione**

**L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo**

Presenza di uno o più animali costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h	
Animali liberi ma catturati (con attacchi idonei) durante le fasi di alimentazione per meno di 1h	
Animali liberi e NON catturati durante le fasi di alimentazione	

Elemento di verifica **18** **Utilizzo della museruola**

**L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo (a meno di prescrizioni documentate del veterinario)**

Utilizzo di museruola per uno o più animali	
Non utilizzo di museruola	

Elemento di verifica **19** **Lettieria dei vitelli con meno di 2 settimane d'età**

**Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto con meno di 2 settimane d'età, in evidenti condizioni non conformi al requisito di legge (lettieria dannosa per il vitello) per assegnare il giudizio peggiorativo**

Non utilizzo della lettiera con superficie di decubito non adeguata	
Utilizzo di lettiera tale che il vitello si sdrai totalmente e completamente su materiale idoneo	

Elemento di verifica **20** **Superficie vitelli fino a 8 settimane d'età (box singolo)**

**Le dimensioni del box singolo riferite ad un vitello di 6-8 settimane dovrebbero avere una lunghezza pari alla lunghezza del vitello misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica moltiplicata per 1,1 (circa 130 cm) ed una larghezza pari all'altezza al garrese del vitello misurata quando l'animale è in stazione (circa 80 cm). Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (0-6 mesi) presenti al momento della visita**

Spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge oppure presenza di uno o più vitelli costantemente legati	
Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme o leggermente superiore (10%) ai limiti di legge	
Spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%)	

Elemento di verifica **21** **Possibilità di contatto con altri vitelli**

**Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. La necessità di avere il contatto non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli (0-6 mesi) presenti al momento della visita**

No	
Sì	

Elemento di verifica **22** **Superficie vitelli (box collettivo)**

**Valutare i vitelli in box collettivo fino a 6 mesi d'età. La superficie è quella totale del box: < 150 kg p.v. = 1,5 m<sup>2</sup>/capo; da 150 a 220 kg p.v. = 1,7m<sup>2</sup>/capo; > 220kg p.v. = 1,8m<sup>2</sup>/capo. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto o di un singolo spazio (box/recinto) in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita**

Dimensioni inferiori ai limiti di legge oppure uno o più vitelli oltre le 8 settimane in box singolo oppure presenza di uno o più vitelli costantemente legati	<input type="checkbox"/>
Dimensioni conformi o leggermente superiori (10%) ai limiti di legge	<input type="checkbox"/>
Dimensioni superiori ai limiti di legge (almeno più del 10%) e/o distribuzione automatica del latte	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **23** **Pavimentazione e superficie di decubito**

**Vanno considerati i pavimenti e le superfici a disposizione degli animali per quanto riguarda il comfort durante il decubito, l'alzata ed il camminamento. NON considerare le condizioni igieniche**

Pavimento fessurato non idoneo (fessura > 2,5 cm) oppure pieno senza materiale da lettiera	<input type="checkbox"/>
Pavimento fessurato idoneo (fessura max 2,5 cm) di legno o rivestito in gomma	<input type="checkbox"/>
Lettiera permanente con materiale organico abbondante e non abrasivo	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **24** **Numero di posti disponibili in mangiatoia**

**Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia (latte/alimento fibroso) considerando che sono necessari indicativamente i seguenti spazi: per animali sotto 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo**

Posti in mangiatoia inferiori al numero di vitelli in caso di alimentazione non <i>ad libitum</i> per latte e fibra	<input type="checkbox"/>
Posti in mangiatoia pari al numero di vitelli in caso di alimentazione non <i>ad libitum</i> per latte e fibra oppure solo per il latte se la fibra è distribuita <i>ad libitum</i>	<input type="checkbox"/>
Posti in mangiatoia più ampi rispetto al previsto (0,5 - 0,6 m/capo) e in caso di fibra <i>ad libitum</i> accesso contemporaneo per almeno 2 soggetti	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **25** **Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi**

**Deve essere presente almeno un abbeveratoio ogni 14 animali o se a vasca 4-5 cm/capo**

Abbeverata al truogolo o numero e dimensioni inferiori al minimo previsto	<input type="checkbox"/>
Numero e dimensioni pari al minimo previsto e almeno un punto di abbeverata in ogni box	<input type="checkbox"/>
Numero e dimensioni superiori al previsto e regolabili in altezza (almeno 2 punti di abbeverata per ogni box)	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **26** **Attrezzature specifiche per la movimentazione**

**È una valutazione sulle strutture previste per movimentare gli animali**

Assenza di corridoi e di barriere mobili per la movimentazione degli animali	<input type="checkbox"/>
Presenza di corridoi fissi a pareti aperte per la movimentazione degli animali	<input type="checkbox"/>
Presenza di corridoi e barriere mobili a pareti chiuse per la movimentazione degli animali	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **27** **Infermeria**

**Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali con patologie ben identificate**

Nessuna struttura specifica	<input type="checkbox"/>
Infermeria identificata in box con pareti cieche che impediscono il contatto con altri animali	<input type="checkbox"/>
Infermeria identificata in appositi locali separati dal resto della mandria, con lettiera asciutta e confortevole	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **28** **Temperatura ed umidità**

**Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla**

Temperatura ed umidità inadeguate, ambienti chiusi e/o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione	<input type="checkbox"/>
Temperatura ed umidità adeguate con ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo	<input type="checkbox"/>
Presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **29** **Presenza di gas nocivi**

NH <sub>3</sub> >10ppm; CO <sub>2</sub> >3.000 ppm; H <sub>2</sub> S >0,5 ppm	<input type="checkbox"/>
NH <sub>3</sub> < 10 ppm; CO <sub>2</sub> tra 1.500 e 3.000 ppm; H <sub>2</sub> S < 0,5 ppm	<input type="checkbox"/>
NH <sub>3</sub> < 10 ppm; CO <sub>2</sub> < 1.500 ppm; H <sub>2</sub> S < 0,5 ppm	<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica **30** **Illuminazione**

**I vitelli non devono restare continuamente al buio. In caso di sola illuminazione artificiale, almeno 8 ore di luce (es. dalle ore 9 alle ore 17) devono essere previste. Inoltre deve essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per controllare i vitelli in qualsiasi momento**

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore/giorno ed in caso di necessità	

**AREA C ANIMAL BASED MEASURES**

Elemento di verifica **31** **Test di avvicinamento passivo**

**Il punteggio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti a ciascun box, arrotondando i decimali al numero intero più prossimo**

Nessun vitello tocca il valutatore in 3 minuti	
Almeno 1 vitello tocca il valutatore in 3 minuti	
Almeno la metà dei vitelli presenti nei box tocca il valutatore in 3 minuti	

Elemento di verifica **32** **Comportamenti fra animali**

**Per comportamenti coesivi si intendono il grooming, lo sfregamento tra animali e l'atteggiamento giocoso (corsa e/o salti), mentre per comportamenti agonistici gli scavalcamenti (buller syndrome) e le testate**

Più del 40% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	
Tra il 20% ed il 40% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	
Meno del 20% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	

Elemento di verifica **33** **Stato di nutrizione (vitelli sopra le 8 settimane d'età)**

**Valori di BCS minori di 2 sono oltre il limite accettato**

Più dell'8% di animali con BCS minore di 2	
Tra il 3% e l'8% di animali con BCS minore di 2	
Meno del 3% di animali con BCS minore di 2	

Elemento di verifica **34** **Pulizia degli animali**

**Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco**

Più del 20% di animali sporchi	
Tra il 10% ed il 20% di animali sporchi	
Meno del 10% di animali sporchi	

Elemento di verifica **35** **Lesioni cutanee**

**Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale). Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi**

Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	
Tra il 5% ed il 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	

Elemento di verifica **36** **Prevalenza di zoppie**

**Considerare il numero di animali zoppi (compreso quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali**

Più del 5% di animali zoppi	
Tra il 2% ed il 5% di animali zoppi	
Meno del 2% di animali zoppi	

Elemento di verifica **37** **Livelli di emoglobina**

**Richiedere i referti analitici del 2° prelievo individuale (70-90 giorni di allevamento) di un gruppo di animali**

Assenza di referti analitici o valori medi < 7,25 g/dl (4,5 mmol/l)	
Valori medi > 7,25 g/dl (4,5 mmol/l)	
Valori medi superiori a 9 g/dl e nessun animale con valore < 7,25 g/dl (4,5 mmol/l)	

Elemento di verifica **38** **Patologie respiratorie (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

**Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano patologia respiratoria lieve (rinite acuta, scolo oculare, lieve alterazione dei caratteri del respiro) o grave (dispnea, alterazione dei caratteri del respiro, depressione del sensorio). Una patologia grave equivale a 3 patologie lievi**

Più del 25% di animali con patologie respiratorie lievi	
Tra il 10% ed il 25% di animali con patologie respiratorie lievi	
Meno del 10% di animali con patologie respiratorie lievi	

Elemento di verifica **39** **Patologie gastro-enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

**Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano regione perineale sporca per diarrea o meteorismo**

Più del 15% di animali con patologie gastro-enteriche	
Tra il 5% ed il 15% di animali con patologie gastro-enteriche	
Meno del 5% di animali con patologie gastro-enteriche	

Elemento di verifica **40** **Mortalità annuale dei vitelli**

**Considerare il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno**

Più del 7%	
Tra il 3% ed il 7%	
Meno del 3%	

Elemento di verifica **41** **Mutilazioni**

Mutilazioni non consentite dalla normativa	
Mutilazioni consentite dalla normativa	
Nessuna mutilazione	

Elemento di verifica **42** **Castrazioni**

**La normativa consente la castrazione, purché eseguita prima della maturità sessuale**

Castrazione eseguita senza il rispetto dei tempi o delle modalità previste dalla normativa	
Castrazione eseguita da un medico veterinario nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Nessuna castrazione	

**AREA BIOSICUREZZA**

Elemento di verifica **43** **Procedure generali di biosicurezza nella lotta a roditori ed insetti**

**Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)**

Assenza totale di procedure	
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	

Elemento di verifica **44** **Precauzioni generali all'ingresso di estranei**

**Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di divieti chiari e rispettati d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)**

Assenza totale di procedure	
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	

Elemento di verifica **45** **Gestione dell'ingresso dei visitatori abituali**

**Nella voce "visitatori" sono compresi veterinari, consulenti aziendali in genere, ecc.**

Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare	
Tutti i "visitatori" sono obbligati ad indossare calzari monouso prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale	
Tutti i "visitatori" devono transitare in un'area spogliatoio e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale	

Elemento di verifica	<b>46</b>	<b>Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda</b>	
Assenza di presidi di disinfezione			<input type="checkbox"/>
Presenza di presidi di disinfezione approssimativi e/o utilizzati solo in caso di emergenza			<input type="checkbox"/>
Presenza di adeguati presidi di disinfezione utilizzati routinariamente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>47</b>	<b>Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati</b>	
<b>I mezzi di trasporto dei mangimi attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (&lt;20 m) con gli animali allevati?</b>			
Sì			<input type="checkbox"/>
No			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>48</b>	<b>Raccolta delle carcasse</b>	
<b>Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (&lt;20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?</b>			
Sì			<input type="checkbox"/>
No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/ sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>49</b>	<b>Carico degli animali vivi (es. per la vendita)</b>	
L'automezzo contiene già altri animali al momento del carico			<input type="checkbox"/>
L'automezzo non contiene animali al momento del carico (è vuoto)			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>50</b>	<b>Gestione dell'accasamento</b>	
<b>Considerare le modalità di accasamento di un nuovo gruppo di animali</b>			
Animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura			<input type="checkbox"/>
Tutto pieno-tutto vuoto			<input type="checkbox"/>
Tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>51</b>	<b>Pulizia dei locali di preparazione del latte</b>	
Locale e attrezzature sporche e non facilmente igienizzabili			<input type="checkbox"/>
Locale e attrezzature pulite			<input type="checkbox"/>
Locale e attrezzature pulite, facilmente igienizzabili e presenza di procedure formalizzate			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>52</b>	<b>Controllo e analisi delle fonti idriche</b>	
<b>L'analisi dell'acqua di bevanda deve essere almeno batteriologica</b>			
Assenza di analisi per l'acqua di pozzo			<input type="checkbox"/>
Analisi una volta all'anno/acqua di acquedotto comunale			<input type="checkbox"/>

<b>AREA</b>	<b>GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME</b>
-------------	---

Elemento di verifica	<b>53</b>	<b>Rumore</b>	
Eccessiva rumorosità			<input type="checkbox"/>
Normale rumorosità			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>54</b>	<b>Allarme impianto di ventilazione</b>	
Assente			<input type="checkbox"/>
Presente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>55</b>	<b>Allarme antincendio</b>	
Assente			<input type="checkbox"/>
Presente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>56</b>	<b>Generatore di corrente</b>	
Assente			<input type="checkbox"/>
Presente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	<b>57</b>	<b>Provenienza dell'acqua di abbeverata</b>	
Provenienza solo da una fonte (pozzo o acquedotto) senza cisterna			<input type="checkbox"/>
Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore			<input type="checkbox"/>
Provenienza da più fonti (acquedotto e pozzo o due pozzi)			<input type="checkbox"/>