

ALLEVAMENTO _____

TECNICO COMPILATORE _____

DATA _____	CODICE ALLEVIX _____	CODICE APA _____	VITELLI (< 6 MESI)	
			TOTALE BOVINI PRESENTI	
			MASCHI	
			MANZI	
			FEMMINE	
			N° ANIMALI PER CICLO	
			N° ANIMALI CIRCOLANTI IN ALLEVAMENTO IN 1 ANNO	

RAZZE PRESENTI _____

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica	1	Numero di addetti che si occupano degli animali	
Un operatore per più di 800 animali			
Un operatore per un numero di animali compreso tra 400 e 800 capi			
Un operatore per meno di 400 animali			

Elemento di verifica	2	Formazione degli addetti	
Il corso si considera di almeno 4 ore (mezza giornata o 2 incontri serali), con rilascio di attestato di partecipazione, effettuato nei 3 anni precedenti da almeno un soggetto, sia esso il titolare o il dipendente assunto			
Esperienza minore di anni 10 e nessun corso di formazione			
Esperienza di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sull'allevamento del bovino da carne			
Esperienza di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente seguito negli ultimi 3 anni			

Elemento di verifica	3	Gestione dei gruppi	
Più di 40 animali per gruppo e/o promiscuità di animali con e senza corna o di animali di taglie differenti oppure animali legati			
Tra 20 e 40 animali per gruppo con taglie poco difformi			
Meno di 20 animali per gruppo, omogenei per età, taglia e tipologia di soggetto			

Elemento di verifica	4	Numero di ispezioni	
Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là delle attività di routine (es. distribuzione razione, pulizia box, ecc.). La segnalazione scritta può essere sostituita in caso di immediata separazione del soggetto/i identificato/i			
Meno di 1 ispezione/giorno			
1 o più ispezioni/giorno			
Più di 1 ispezione/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata			

Elemento di verifica	5	Tipologia di movimentazione	
E' rivolta prevalentemente alla movimentazione durante le operazioni di carico/scarico e per cambiare gruppo/box all'interno della stalla. L'uso della forca (sia come difesa che come strumento di induzione) è da considerarsi "strumento appuntito"			
Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)			
Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)			

Elemento di verifica **6 Gestione della razione**

La razione specifica deve essere scritta su carta o inserita su pesa

Razione empirica senza calcoli relativi ai fabbisogni o presenza di indicazioni sommarie e datate e/o scorretta conservazione degli alimenti	
Razione calcolata da un alimentarista e corretta conservazione degli alimenti	

Elemento di verifica **7 Fasi alimentari**

Si considerano sufficienti almeno 2 fasi alimentari, una per l'arrivo dei soggetti ed una per le successive fasi di accrescimento

Una sola fase alimentare	
Due fasi alimentari (condizionamento e ingrasso)	
Più di 2 fasi alimentari (es. adattamento - ingrasso 1 ^a e 2 ^a parte - finissaggio)	

Elemento di verifica **8 Tipologia di alimentazione**

Non garantita nelle 24h e frazionata	
Garantita nelle 24h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)	
Carro unifeed disponibile per 24h	

Elemento di verifica **9 Concentrati nella razione (dose giornaliera)**

Se la % di s.s. da concentrati sul totale della s.s. giornaliera è al limite tra due giudizi, considerare il contenuto di fibra dei concentrati (la presenza di alimenti fibrosi quali: crusca, polpe secche di barbabietola, pastazzo d'agrumi, buccette di soia, medica pellettata, trebbie di birra) come fattore di miglioramento della risposta

Concentrati superiori all'80% della s.s. e contenuto medio di fibra inferiore al 6%	
Concentrati tra il 70% e l'80% della s.s. e contenuto medio di fibra maggiore del 6%	
Concentrati inferiori al 70% della s.s. e presenza di almeno 1 kg di paglia o fieno	

Elemento di verifica **10 Disponibilità di acqua**

Assenza di acqua di bevanda o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) per uno o più animali	
Presenza di abbeveratoi funzionanti a "spinta"	
Presenza di abbeveratoi funzionanti a "livello"	

Elemento di verifica **11 Pulizia degli abbeveratoi**

L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi	
Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida	

Elemento di verifica **12 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera**

NON considerare il tipo di materiale utilizzato per la lettiera. Valutare l'igiene, la pulizia e la gestione dello spazio adibito al decubito degli animali. La lettiera deve essere asciutta, pulita (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e correttamente gestita con rabbocco settimanale e sostituita a fine ciclo di ingrasso. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione sarà al massimo intermedia

Ambienti sporchi e non gestiti e/o assenza di lettiera in quasi tutti i gruppi	
Ambienti discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi	
Ambienti puliti ed asciutti, lettiera con materiale idoneo e rabbocco a giorni alterni in tutti i gruppi	

Elemento di verifica **13 Biosicurezza**

Questa valutazione è eseguita a posteriori dal sistema di calcolo informatico, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'Area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nella mandria

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)	

AREA B STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Elemento di verifica **14 Tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età**

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali, oltre i 6 mesi d'età. Fanno eccezione i soggetti legati per "richiesta scritta e motivata" del veterinario

Fissa per anche un solo gruppo di animali o libera con assenza di riparo	
Libera per tutti i gruppi di animali, con riparo da sole e pioggia	
Libera per tutti gli animali con adeguata area di riparo e con possibilità di accedere ad un'area di esercizio e/o pascolo	

Elemento di verifica **15 Superficie disponibile per il decubito**

**Escludere la corsia di accesso all'alimento (circa 1,5 m).
Si considera superficie minima un'area di riposo di 2,5 m²/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v.
Si considera superficie migliorativa un'area di riposo di 4,5 m²/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m²/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v.**

Inferiore alla superficie minima prevista o animali legati	
Compresa tra la superficie minima e quella migliorativa previste	
Superiore o uguale alla superficie migliorativa prevista	

Elemento di verifica **16 Pavimentazione e superficie di decubito**

Si devono considerare i pavimenti e le superfici a disposizione degli animali per quanto riguarda il comfort durante il decubito, l'alzata ed il camminamento. NON considerare le condizioni igieniche

Pavimento fessurato non idoneo oppure pieno ma liscio e scivoloso	
Fessurato idoneo e rivestito in gomma, o pavimento pieno con buona rugosità, o lettiera permanente in quantità sufficiente	
Lettieria permanente con materiale organico adeguato (abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente)	

Elemento di verifica **17 Presenza di educatori elettrici**

Assegnare il giudizio negativo in presenza di educatori elettrici in qualsiasi gruppo di animali

Presenza di educatori con campo elettrico	
Assenza di educatori elettrici	

Elemento di verifica **18 Numero di posti disponibili in mangiatoia**

Dimensionamento: per animali sotto 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo; per animali oltre 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo

→ Per razioni frazionate: meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
→ Per razioni con unifeed: meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
→ Per razioni frazionate: il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
→ Per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
Corretta disposizione della stalla, posti in mangiatoia superiori al 20% dei capi presenti e nessun rischio di soffocamento	

Elemento di verifica **19 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi**

Per assegnare il giudizio intermedio deve essere presente almeno un abbeveratoio ogni 13 animali o, se a vasca, 6 cm/capo. Per assegnare il giudizio migliorativo deve essere presente almeno un abbeveratoio a livello ogni 8 animali o, se a tazza, almeno due punti di abbeverata distinti (per non più di 8 animali)

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto	
Numero e dimensioni pari al minimo previsto	
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate	

Elemento di verifica **20 Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età**

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto, con meno di 2 settimane d'età, in evidenti condizioni non conformi al requisito di legge (lettiera dannosa per il vitello) per assegnare il giudizio peggiorativo

Non utilizzo della lettiera con superficie di decubito non adeguata	
Utilizzo di lettiera tale che il vitello si sdrai totalmente e completamente su materiale idoneo	

Elemento di verifica **21 Superficie vitelli fino a 8 settimane d'età (box singolo)**

Le dimensioni del box singolo riferite ad un vitello di 6-8 settimane dovrebbero avere una lunghezza pari alla lunghezza del vitello misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica moltiplicato per 1,1 (circa 130 cm) ed una larghezza pari all'altezza al garrese del vitello misurata quando l'animale è in stazione (circa 80 cm). Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (0- 6 mesi) presenti al momento della visita

Spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge oppure presenza di uno o più vitelli costantemente legati	
Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme o leggermente superiore (10%) ai limiti di legge	
Spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%)	

Elemento di verifica **22 Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli**

Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. La necessità di avere il contatto non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli (0-6 mesi) presenti al momento della visita

No	
Sì	

Elemento di verifica **23 Superficie vitelli (box collettivo)**

Valutare i vitelli in box collettivo fino a 6 mesi d'età. La superficie è quella totale del box: < 150 kg p.v. = 1,5 m²/capo; da 150 a 220 kg p.v. = 1,7 m²/capo; > 220kg p.v. = 1,8 m²/capo. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto o di un singolo spazio (box/recinto) in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio peggiorativo. Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita

Dimensioni inferiori ai limiti di legge oppure uno o più vitelli oltre le 8 settimane in box singolo/oppure uno o più vitelli costantemente legati	
Dimensioni conformi o leggermente superiori (10%) ai limiti di legge	
Dimensioni superiori ai limiti di legge (almeno più del 10%) e/o distribuzione automatica del latte	

Elemento di verifica **24 Attrezzature specifiche per la movimentazione**

E' una valutazione sulle strutture previste per movimentare gli animali (cambio gruppo/box) all'interno della stalla

Assenza di corridoi e di barriere mobili per la movimentazione degli animali	
Presenza di corridoi fissi a pareti aperte per la movimentazione degli animali	
Presenza di corridoi e barriere mobili a pareti chiuse per la movimentazione degli animali	

Elemento di verifica	25	Attrezzature per la cattura degli animali
Sono considerate le attrezzature necessarie a contenere gli animali per le terapie o altre necessità		
Assenza di attrezzature per la cattura ed immobilizzazione		
Presenza di sistemi di cattura non specifici ma efficaci		
Presenza di attrezzature specifiche per la cattura ed immobilizzazione		

Elemento di verifica	26	Infermeria
Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali con patologie ben identificate		
Nessuna struttura specifica o box infermeria con grigliato senza lettiera		
Locale infermeria identificato con lettiera		
Infermeria separata dal resto della mandria, con lettiera e registro dei capi		

Elemento di verifica	27	Temperatura ed umidità
Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla		
Temperatura ed umidità inadeguate, ambienti chiusi e/o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione		
Temperatura ed umidità adeguate con ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo		
Presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati		

Elemento di verifica	28	Presenza di gas nocivi
NH ₃ > 20 ppm; CO ₂ > 3.000 ppm; H ₂ S > 0,5 ppm		
NH ₃ tra 10 e 20 ppm; CO ₂ tra 1.500 e 3.000 ppm; H ₂ S < 0,5 ppm		
NH ₃ < 10 ppm; CO ₂ < 1.500 ppm; H ₂ S < 0,5 ppm		

Elemento di verifica	29	Illuminazione
Assenza di illuminazione artificiale		
Presenza di illuminazione artificiale		
Illuminazione artificiale corretta (almeno 40 lux) anche di notte		

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
-------------	----------	------------------------------

Elemento di verifica	30	Test di fuga dall'uomo
Il punteggio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti a ciascun animale, arrotondando i decimali al numero intero più prossimo		
Difficoltà di avvicinamento		
Animali curiosi che si avvicinano		
Animali che si avvicinano e si fanno toccare		

Elemento di verifica	31	Comportamento fra animali
Per comportamenti coesivi si intendono il grooming e lo sfregamento tra animali, mentre per comportamenti agonistici gli scavalcamenti (buller syndrome) e le testate		
Più del 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati		
Tra il 10% e il 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati		
Meno del 10% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati		

Elemento di verifica	32	Stato di nutrizione
Valori di BCS minori di 2 sono oltre il limite accettato		
Più del 10% di animali con BCS minore di 2		
Tra il 2% e il 10% di animali con BCS minore di 2		
Meno del 2% di animali con BCS minore di 2		

Elemento di verifica **33 Pulizia degli animali**

Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco

Più del 40% di animali sporchi	
Tra il 10% e il 40% di animali sporchi	
Meno del 10% di animali sporchi	

Elemento di verifica **34 Lesioni cutanee**

Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale)

Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	
Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	
Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli	

Elemento di verifica **35 Prevalenza di zoppie**

Considerare il numero di animali zoppi (compreso quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali

Più del 6% di animali zoppi	
Tra il 2% ed il 6% di animali zoppi	
Meno del 2% di animali zoppi	

Elemento di verifica **36 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea

Più del 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	
Tra il 5% ed il 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	
Meno del 5% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	

Elemento di verifica **37 Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41 giorni (fino alla macellazione), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea

Più del 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	
Tra il 2% ed il 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	
Meno del 2% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	

Elemento di verifica **38 Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea

Più del 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Tra il 20% ed il 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Meno del 20% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	

Elemento di verifica **39** **Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41 giorni (fino alla macellazione), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea

Più del 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	<input type="text"/>
Tra il 10% ed il 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	<input type="text"/>
Meno del 10% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	<input type="text"/>

Elemento di verifica **40** **Mortalità annuale dei bovini**

Considerare il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanasiati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno

Più del 5%	<input type="text"/>
Tra il 2 % ed il 5%	<input type="text"/>
Meno del 2%	<input type="text"/>

Elemento di verifica **41** **Mutilazioni**

Mutilazioni non consentite dalla normativa	<input type="text"/>
Mutilazioni consentite dalla normativa eseguite da un medico veterinario o sotto il suo controllo con modalità previste dalla normativa oppure presenza di animali con mutilazioni non consentite dalla normativa ma giustificate da idonea documentazione	<input type="text"/>
Nessuna mutilazione	<input type="text"/>

Elemento di verifica **42** **Castrazioni**

La normativa consente la castrazione, purché eseguita prima della maturità sessuale

Castrazione eseguita senza il rispetto dei tempi o delle modalità previste dalla normativa	<input type="text"/>
Castrazione eseguita da un medico veterinario nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	<input type="text"/>
Nessuna castrazione	<input type="text"/>

AREA BIOSICUREZZA

Elemento di verifica **43** **Procedure generali di biosicurezza nella lotta a roditori ed insetti**

Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)

Assenza totale di procedure	<input type="text"/>
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	<input type="text"/>
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	<input type="text"/>

Elemento di verifica **44** **Precauzioni generali all'ingresso di estranei**

Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di divieti chiari e rispettati d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)

Assenza totale di procedure	<input type="text"/>
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	<input type="text"/>
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	<input type="text"/>

Elemento di verifica **45 Gestione dell'ingresso dei visitatori abituali**
Nella voce "visitatori" sono compresi veterinari, consulenti aziendali in genere, ecc.

Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare	
Tutti i "visitatori" sono obbligati ad indossare calzari monouso prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale	
Tutti i "visitatori" devono transitare in un'area spogliatoio e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale	

Elemento di verifica **46 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda**
Assenza di presidi di disinfezione
Presenza di presidi di disinfezione approssimativi e/o utilizzati solo in caso di emergenza
Presenza di adeguati presidi di disinfezione utilizzati routinariamente

Elemento di verifica **47 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati**
I mezzi di trasporto dei mangimi attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (<20 m) con gli animali allevati?
Sì
No

Elemento di verifica **48 Raccolta delle carcasse**
Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (<20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?
Sì
No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e

Elemento di verifica **49 Carico di animali vivi (es. per la vendita) (1)**
L'automezzo contiene già altri animali al momento del carico
L'automezzo non contiene animali al momento del carico (è vuoto)

Elemento di verifica **50 Carico di animali vivi (es. per la vendita) (2)**
Il carico viene effettuato vicino ai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (<20 m)
Il carico viene effettuato lontano dai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (>20 m)

Elemento di verifica **51 Quarantena**
Nessuna forma di quarantena
Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/tempi brevi/nessun esame biologico)
Nessun acquisto di animali da anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali acquistati

Elemento di verifica **52 Controllo e analisi delle fonti idriche**
L'analisi dell'acqua di bevanda è valida anche quando è solo batteriologica
Assenza di analisi per l'acqua di pozzo
Analisi una volta all'anno/acqua di acquedotto comunale

AREA GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME

Elemento di verifica **53 Rumore**
Eccessiva rumorosità
Normale rumorosità

Elemento di verifica	54	Allarme impianto di ventilazione	
Assente			<input type="checkbox"/>
Presente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	55	Allarme antincendio	
Assente			<input type="checkbox"/>
Presente			<input type="checkbox"/>

Elemento di verifica	56	Provenienza dell'acqua di abbeverata	
Provenienza solo da una fonte (pozzo o acquedotto) senza cisterna			<input type="checkbox"/>
Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore			<input type="checkbox"/>
Provenienza da più fonti (acquedotto e pozzo o due pozzi)			<input type="checkbox"/>